



## Categorie di persone particolarmente a rischio

Nell'indicare le categorie di persone particolarmente a rischio alla malattia di COVID-19, l'UFSP tiene conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche e delle valutazioni delle società mediche svizzere. L'UFSP aggiorna costantemente le categorie di persone particolarmente a rischio.

Sono considerati particolarmente a rischio:

- A Persone di età  $\geq$  65 anni**
- B Persone di età  $\geq$  16 anni affette da malattie croniche secondo l'elenco seguente**
- C Persone di età  $\geq$  16 anni affette dalla trisomia 21**

Le persone di età  $\geq$  16 anni affette da una delle malattie croniche seguenti (gruppo B) sono considerate particolarmente a rischio:

### 1. Ipertensione arteriosa

- Ipertensione arteriosa con danno agli organi bersaglio
- Ipertensione arteriosa resistente alla terapia

### 2. Malattie cardiovascolari

#### 2.1 Criteri generali

- Pazienti con dispnea della classe funzionale NYHA II–IV e NT-Pro BNP > 125 pg/ml
- Pazienti con almeno 2 fattori di rischio cardiovascolare (di cui uno è il diabete o l'ipertensione arteriosa)
- Ictus cerebrale pregresso e/o vasculopatia sintomatica
- Insufficienza renale cronica (stadio 3, GFR <60ml/min)

#### 2.2 Altri criteri

##### 2.2.1 Cardiopatie coronariche

- Infarto miocardico (STEMI e NSTEMI) negli ultimi 12 mesi
- Sindrome coronarica cronica sintomatica, nonostante la terapia farmacologica (indipendentemente da un'eventuale precedente rivascolarizzazione)

##### 2.2.2 Malattie delle valvole cardiache

- Stenosi da moderata a severa o severa e/o rigurgito valvolare, in aggiunta ad almeno un criterio generale
- Tutte le sostituzioni valvolari chirurgiche o percutanee, in aggiunta ad almeno un criterio generale

##### 2.2.3 Insufficienza cardiaca

- Pazienti con dispnea della classe funzionale NYHA II-IV o NT-pro BNP > 125 pg/ml, nonostante la terapia farmacologica per tutti i valori LVEF (HFpEF, HFmrEF, HFrEF)
- Cardiomiopatie di tutte le eziologie
- Ipertensione arteriosa polmonare

##### 2.2.4 Aritmie cardiache

- Fibrillazione atriale con un punteggio CHA2DS2-VASc pari ad almeno 2
- Precedente impianto di un pacemaker cardiaco (incl. ICD e/o CRT), in aggiunta a un criterio generale

##### 2.2.5 Cardiopatie congenite dell'adulto

- Cardiopatia congenita dopo valutazione individuale da parte del cardiologo curante



### 3. Diabete

- Diabete mellito, con complicanze tardive o con un valore di HbA1c uguale o superiore all'8 per cento

### 4. Malattie croniche dei polmoni e delle vie respiratorie

- Malattie polmonari ostruttive croniche allo stadio GOLD II-IV
- Enfisema polmonare
- Forme di asma bronchiale particolarmente severe e non controllate
- Pneumopatie interstiziali / fibrosi polmonare
- Cancro attivo ai polmoni
- Ipertensione arteriosa polmonare
- Malattia vascolare polmonare
- Sarcoidosi attiva
- Fibrosi cistica
- Infezioni polmonari croniche (micobatteriosi atipiche, bronchiectasie ecc.)
- Pazienti sottoposti a respirazione artificiale
- Malattie che riducono gravemente la capacità polmonare

### 5. Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario

- Immunosoppressione grave (p. es. infezione da HIV con un numero di linfociti T CD4+ < 200/ $\mu$ l)
- Neutropenia (<1'000 neutrofili/ $\mu$ l) durante  $\geq$ 1 settimana
- Linfocitopenia (<200 linfociti/ $\mu$ l)
- Immunodeficienze ereditarie
- Assunzione di medicinali che sopprimono la risposta immunitaria (p. es. assunzione prolungata di glucocorticoidi (equivalente di prednisolone > 20 mg/giorno), anticorpi monoclonali, citostatici ecc.)
- Linfomi aggressivi (tutti i tipi)
- Leucemia linfatica acuta
- Leucemia mieloide acuta
- Leucemia promielocitica acuta
- Leucemia prolinfocitica a cellule T
- Linfomi primari del sistema nervoso centrale
- Trapianto di cellule staminali
- Amiloidosi (amiloidosi da catene leggere (AL))
- Leucemia linfatica cronica
- Mieloma multiplo
- Anemia falciforme
- Trapianto di midollo osseo
- Trapianto di organi
- Persone in lista d'attesa per un trapianto

### 6. Cancro

- Malattie tumorali in corso di trattamento medico



### **7. Obesità**

- Pazienti con un indice di massa corporea (IMC) pari o superiore a 35 kg/m<sup>2</sup>

### **8. Epatopatia**

- Cirrosi epatica

### **9. Nefropatia**

- Insufficienza renale cronica, a partire da GFR < 60 ml/min

#### **Informazioni sulle raccomandazioni di vaccinazione per le donne incinte:**

Le donne incinte senza fattori di rischio non sono considerate persone particolarmente a rischio (PPR). Per queste donne, la vaccinazione anti-COVID-19 è raccomandata su base individuale. Le donne incinte con malattie croniche secondo l'elenco sopra sono considerate PPR a causa della loro malattia preesistente. Maggiori informazioni sono disponibili nelle Linee guida e raccomandazioni di vaccinazione anti-COVID-19.