



Disponibilità limitata di vaccini antirabbici – priorizzazione delle indicazioni di vaccinazione

Stato al 5.02.2024

1 Contesto

Nel quarto trimestre del 2023 il Centro di notifica degli agenti terapeutici dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) ha segnalato difficoltà di approvvigionamento di vaccini antirabbici¹. Il mercato svizzero è rifornito da diverse settimane attingendo alle scorte obbligatorie (vaccini antirabbici Rabipur® e Mérieux®). Attualmente i fabbricanti non sono in grado di soddisfare completamente il mercato svizzero (e nemmeno quello mondiale). Non è chiaro per quanto tempo si protrarrà questa situazione.

I vaccini disponibili dovrebbero quindi essere temporaneamente utilizzati in via prioritaria per le indicazioni vitali, secondo le raccomandazioni di sostituzione illustrate di seguito.

2 Priorizzazione delle indicazioni per la vaccinazione antirabbica

In considerazione dell'attuale disponibilità limitata di vaccini antirabbici e del fatto che non disponiamo di dati sulle scorte esistenti presso i fruitori di vaccini, si **consiglia ai medici, ai centri di vaccinazione e agli ospedali di riservare un certo numero di dosi per le vaccinazioni post-esposizione**, e inoltre di utilizzare dei dosi di vaccino per le vaccinazioni pre-esposizione solo selettivamente secondo l'ordine di priorità. Presupponendo un uso ottimale della limitata disponibilità di vaccini antirabbici, l'UFSP e la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) raccomandano di **attribuire il seguente ordine di priorità decrescente** alle indicazioni di vaccinazione:

2.1. Ordine di priorità

- I. **Vaccinazione post-esposizione** (persone esposte al rischio di rabbia, per esempio morse o graffiate da un animale potenzialmente portatore del virus della rabbia)
- II. Vaccinazione pre-esposizione di **persone esposte professionalmente** (in Svizzera o all'estero)
- III. Vaccinazione pre-esposizione di **viaggiatori** che si recano in regioni enzootiche e **presentano un elevato rischio individuale indipendentemente dalla durata del viaggio**, per esempio in caso di lavori professionali con animali, viaggi in bicicletta o in moto, trekking, accesso limitato all'assistenza medica. Anche i bambini dovrebbero essere vaccinati in via prioritaria, poiché sono a maggior rischio di morsi (p. es. al viso) e la loro esposizione al virus della rabbia può passare inosservata
- IV. Vaccinazione pre-esposizione di **altri viaggiatori** che si recano in regioni enzootiche **a seconda della durata del viaggio** in caso di soggiorni nelle seguenti aree:
 - Africa, Bolivia, Venezuela, subcontinente indiano (India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka), Filippine: per soggiorni di durata **> 1 mese**
 - resto dell'Asia: per soggiorni di durata **> 3 mesi**

¹ [Penurie attuali \(admin.ch\)](#) > [Interruzioni delle forniture di vaccini](#)

2.2. Modalità di somministrazione

A) Vaccinazione post-esposizione

Le indicazioni e la procedura per la profilassi post-esposizione (PEP) sono descritte nel [documento sulla profilassi pre- e post-esposizione della rabbia umana](#) (disponibile in tedesco e francese) [1].

B) Vaccinazione pre-esposizione

Qualsiasi vaccinazione pre-esposizione dovrebbe essere rimandata, per quanto possibile, fino a quando l'approvvigionamento di vaccini antirabbici si sarà normalizzato.

All'occorrenza può essere proposta una somministrazione intradermica (per la quale è richiesta una quantità minore di vaccino) per la profilassi pre-esposizione contro la rabbia secondo l'ordine di priorità di cui sopra. Tale modalità di somministrazione richiede una tecnica speciale e prevede uno schema di vaccinazione diverso da quello omologato in Svizzera [1]. È quindi offerta solo da centri e medici specializzati in medicina di viaggio. Si consiglia di prenotare un appuntamento in anticipo. Contatto: HealthyTravel.ch

- La somministrazione **intradermica** va presa in considerazione per tutte le vaccinazioni (nuove o complementari) nei centri di medicina di viaggio.
- La somministrazione **intramuscolare** continua a essere raccomandata per la vaccinazione di bambini e persone immunosopresse.

3 Avviso riguardante le vaccinazioni di richiamo per i viaggiatori

A causa delle attuali difficoltà di approvvigionamento, al momento il richiamo della vaccinazione pre-esposizione dei viaggiatori un anno dopo la primovaccinazione o in caso di nuovi viaggi **non** è raccomandato.

4 Ulteriori informazioni importanti

Per ulteriori informazioni si prega di contattare, tramite il sito web HealthyTravel.ch, uno dei centri specializzati in medicina di viaggio.

5 Bibliografia

1. Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Commissione federale per le vaccinazioni (CFV). Prä- und post-expositionelle Tollwutprophylaxe beim Menschen. Richtlinien und Empfehlungen. Berna: UFSP, 2021. www.bag.admin.ch/Tollwut

Link utili

www.bag.admin.ch/rabbia

www.bag.admin.ch/approvvigionamentovaccini

Contatto

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Divisione Malattie trasmissibili

Sezione Vaccinazioni

epi@bag.admin.ch

Tel. segreteria: +41 (0)58 463 87 06

Comitato di esperti per la medicina di viaggio

info@healthytravel.ch