


COVID-19 : recommandation de vaccination pour l'automne/hiver 2022

Les vaccinations de rappel doivent être effectuées à un intervalle d'au moins 4 mois après la dernière vaccination ou une infection connue.
 Pour des informations complémentaires et les dosages, veuillez consulter le tableau synoptique en annexe 1 de la recommandation de vaccination.



- De préférence vaccins bivalents à ARNm ou Nuvaxovid® ; vaccin monovalent à ARNm si vaccin bivalent indisponible.
 La vaccination avec Nuvaxovid® n'est pas recommandée aux femmes enceintes ou qui allaitent.
- Pour les personnes gravement immunodéficientes, les vaccins monovalents à ARNm sont recommandés. Les vaccins bivalents peuvent être administrés aux personnes concernées dès 16 ans selon avis du médecin. Pour les personnes de moins de 30 ans, il est recommandé de privilégier la vaccination avec Comirnaty®.
- 5 à 11 ans : Comirnaty® monovalent, dosage pour enfants
- 12 à 15 ans : de préférence Comirnaty® monovalent ou Nuvaxovid®

- Possibilités à la disposition des personnes non vaccinées :
- À partir de 16 ans : 2 doses de vaccin monovalent à ARNm (de préférence Comirnaty® pour les moins de 30 ans) ou de Nuvaxovid® à un intervalle de 4 semaines.
 - 5 à 15 ans sans infection passée : 2 doses de vaccin () à un intervalle de 4 semaines.