


Impfempfehlung für die Covid-19-Impfung im Herbst/Winter 2022

Bei Auffrischimpfungen soll ein Minimalintervall von 4 Monaten zur letzten Impfung oder bekannten Infektion eingehalten werden.
Für weitere Informationen und Dosierungen beachten Sie bitte die tabellarische Übersicht im Anhang 1 der Impfempfehlung.



Bivalente mRNA-Impfstoffe oder Nuvaxovid® bevorzugt; monovalente mRNA-Impfstoffe, wenn bivalente nicht verfügbar sind.
Die Impfung mit Nuvaxovid® ist schwangeren und stillenden Frauen nicht empfohlen.

Für schwer immundefiziente Personen sind monovalente mRNA-Impfstoffe empfohlen. Bivalente mRNA-Impfstoffe können bei Personen ab 16 Jahren nach ärztlichem Ermessen eingesetzt werden.
Für Personen unter 30 Jahren ist die Impfung präferenziell mit Comirnaty® empfohlen.

5 – 11 Jahre: Comirnaty® monovalent Kinderdosierung
12 – 15 Jahre: präferenziell Comirnaty® monovalent oder Nuvaxovid®

Mögliche Alternative für ungeimpfte Personen

- Ab 16 Jahren : 2 Impfdosen monovalenter mRNA-Impfstoff (unter 30 Jahren präferenziell Comirnaty®) oder Nuvaxovid® im Abstand von 4 Wochen.
- Im Alter von 5-15 Jahren ohne bisherige Infektion: 2 Impfdosen im Abstand von 4 Wochen.