Impfempfehlung für die Covid-19-Impfung im Herbst/Winter 2022/23

Bei Auffrischimpfungen soll ein Minimalintervall von 4 Monaten zur letzten Impfung oder bekannten Infektion eingehalten werden.
Für weitere Informationen und Dosierungen beachten Sie bitte die tabellarische Übersicht im Anhang 1 der Impfempfehlung.

Besonders gefährdete Personen (BGP)

- Bisher geimpft? – Nein → BGP: Empfehlungsstärke stark → 2 Impfdosen im Abstand von mind. 4 Wochen
- Bisher geimpft? – Ja → BGP: Empfehlungsstärke stark → Eine Impfdosis

Allgemeine Bevölkerung ab 16 Jahren (inkl. Gesundheitspersonal)

- Gesundheitspersonal, Betreuungspersonen von BGP: Empfehlungsstärke mittel → Eine Impfdosis
- Alle weiteren Personen von 16-64 Jahre: Empfehlungsstärke gering → Eine Impfdosis

Personen ab 12 Jahren mit schwerer Immundefizienz

- Bisher geimpft? – Ja → Eine Impfdosis
- Bisher geimpft? – Nein → Grundimmunisierung mit 3 Impfdosen im Abstand von jeweils mind. 4 Wochen plus eine Auffrischimpfung

Kinder und Jugendliche (5-15 Jahre) (immunkompetent)

- Bisher geimpft? – Nein – Mit chronischen Krankheiten? – Ja → Eine Impfdosis
- Bisher geimpft? – Nein – Mit chronischen Krankheiten? – Nein → Keine Impfung empfohlen
- Bisher geimpft? – Ja → Keine Impfung empfohlen

Kinder (5-11 Jahre) mit schwerer Immundefizienz

- Bisher geimpft? – Ja → 2 Impfdosen im Abstand von mind. 4 Wochen + Serologie: Wenn Titer grenzwertig / keine Antikörper vorhanden: 3. Dosis
- Bisher geimpft? – Nein → 2 Impfdosen im Abstand von mind. 4 Wochen + Serologie: Wenn Titer grenzwertig / keine Antikörper vorhanden: 3. Dosis

Bivalente mRNA-Impfstoffe oder *Nuvaxovid®* bevorzugt; monovalente mRNA-Impfstoffe, wenn bivalente nicht verfügbar sind.
Die Impfung mit *Nuvaxovid®* ist schwangeren und stillenden Frauen nicht empfohlen.

Für schwer immundefiziente Personen sind monovalente mRNA-Impfstoffe empfohlen. Bivalente mRNA-Impfstoffe können bei Personen ab 16 Jahren nach ärztlichem Ermessen eingesetzt werden.
Für Personen unter 30 Jahren ist die Impfung präferenziell mit *Comirnaty®* empfohlen.

5 – 11 Jahre: *Comirnaty® monovalent* Kinderdosierung
12 – 15 Jahre: präferenziell *Comirnaty® monovalent* oder *Nuvaxovid®*

Mögliche Alternative für ungeimpfte Personen

- Ab 16 Jahren : 2 Impfdosen monovalenter mRNA-Impfstoff (unter 30 Jahren präferenziell *Comirnaty®*) oder *Nuvaxovid®* im Abstand von 4 Wochen.
- Im Alter von 5-15 Jahren ohne bisherige Infektion: 2 Impfdosen () im Abstand von 4 Wochen.
- Explizit nur Personen ab 18 Jahren, welche ungeimpft sind und aus medizinischen Gründen nicht mit einem mRNA- oder Protein-Impfstoff geimpft werden können oder diese Impfstoffe ablehnen, wird eine Einzeldosis *COVID-19 Vaccine Janssen®* empfohlen. Die Impfung mit *COVID-19 Vaccine Janssen®* ist für schwangere und stillende Frauen nicht empfohlen.

Bundesamt für Gesundheit BAG, Version 1-02/2022